


7 渦度方程式

総観規模あるいは全球規模の大気の運動を考える。このような大きな空間スケールでの大気の運動においては、鉛直方向の運動よりも水平方向の運動のほうがずっと大きい。しかも、水平方向の運動の中でも、収束、発散成分は相対的に小さく、低気圧や高気圧などで見られるような渦、つまり回転成分のほうが卓越している。そこで、回転成分に着目して大気の運動を論じてみる。

7.1 渦度

大気の回転成分を定量化する方法を考えてみる。図のような反時計回りに回転する渦を考えてみる。南北風に注目すると、西(図の左)のほうでは北風($v < 0$)になっているが、東のほうでは南風($v > 0$)になっている。これを偏微分で表すと $\frac{\partial v}{\partial x} > 0$ となる。また、東西風に注目すると、南(図の下)のほうでは西風($u > 0$)になっているが、北のほうでは東風($u < 0$)になっている。偏微分で表せば、 $\frac{\partial u}{\partial y} < 0$ となる。



渦と渦度

このように考えると、 $\frac{\partial v}{\partial x}$ と $-\frac{\partial u}{\partial y}$ は反時計回りの回転の度合いを表しているともみなすことができそうである。そこで、

$$\xi = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$$

を**渦度**と定義することにする。以下では、この点に留意しながら、プリミティブ方程式系における運動方程式の y 成分 (v の時間変化についての式) の x 微分や、 x 成分 (u の時間変化についての式) の y 微分を計算し、渦度についての方程式を導いてみる。

7. 2 渦度方程式

プリミティブ方程式系を用いて、大気の運動の回転成分を考える。第6章の(1)、(2)より、

$$\frac{\partial}{\partial t}u + u \frac{\partial}{\partial x}u + v \frac{\partial}{\partial y}u + \omega \frac{\partial}{\partial p}u = fv - \frac{\partial \Phi}{\partial x} + F_x \quad (1)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}v + u \frac{\partial}{\partial x}v + v \frac{\partial}{\partial y}v + \omega \frac{\partial}{\partial p}v = -fu - \frac{\partial \Phi}{\partial y} + F_y \quad (2)$$

(1)を y で偏微分し、(2)を x で偏微分すると、

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} + \omega \frac{\partial}{\partial p} \right) \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \omega}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial p} \\ & = f \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{df}{dy} v - \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \Phi + \frac{\partial}{\partial y} F_x \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} + \omega \frac{\partial}{\partial p} \right) \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial \omega}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial p} \\ & = -f \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \Phi + \frac{\partial}{\partial x} F_y \end{aligned} \quad (4)$$

(4)−(3)より、

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} + \omega \frac{\partial}{\partial p} \right) \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial p} - \frac{\partial \omega}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial p} \right) \\ & = -f \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) - \frac{df}{dy} v + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \end{aligned} \quad (5)$$

ここで、渦度 (**相対渦度**) ξ を

$$\xi = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \quad (6)$$

と定義し、さらに、

$$\beta = \frac{df}{dy} \quad (7)$$

とすると、

$$\frac{D}{Dt} \xi + \beta v = -(f + \xi) \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \left(\frac{\partial \omega}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial p} - \frac{\partial \omega}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial p} \right) + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \quad (8)$$

(8)の左辺第2項はベータ項とよばれ、**惑星渦度**の南北移流の効果を表している。右辺第1項は**発散項**である。(f + ξ)は惑星渦度と相対渦度の和であり、**絶対渦度**とよばれる。 $\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)$ は水平発散である。右辺第2項は傾斜項である。全球規模、総観規模では、この項の寄与は小さく無視できる。右辺第3項は粘性項である。

(8)で傾斜項と粘性項を無視すると、

$$\frac{D}{Dt} \xi + \beta v = -(f + \xi) \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \quad (9)$$

となる。ここで、水平風が発散成分を含まない、つまり、 $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$ と仮定する。このとき、水平風(u, v)は**流線関数**Ψを用いて、

$$u = -\frac{\partial \Psi}{\partial y}, \quad v = \frac{\partial \Psi}{\partial x} \quad (10)$$

と表すことができ、相対渦度ξは、

$$\xi = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \Psi \quad (11)$$

と書ける。したがって、(9)は

$$\frac{D}{Dt} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \Psi + \beta \frac{\partial}{\partial x} \Psi = 0 \quad (12)$$

と表せる。中緯度の対流圏では西風が卓越する。そこで、南北風がなく、西風が定常かつ一様に吹いている基本場で大気の運動を考えてみる。このような基本場の中で微小なじょう乱を考えるのであれば、 $\frac{D}{Dt} \approx \frac{\partial}{\partial t} + U \frac{\partial}{\partial x}$ と近似することが

ができる。また、流線関数Ψは、基本場についての流線関数Ψ₀とじょう乱場についての流線関数Ψ'に分けて、Ψ = Ψ₀ + Ψ'と書くことができる。基本場には

南北風はないのでΨ₀はyのみの関数であり、東西風は南北方向に変化しないか

ら $\frac{d^2}{dy^2} \Psi_0 = 0$ である。ゆえに、(12)は

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + U \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \Psi' + \beta \frac{\partial}{\partial x} \Psi' = 0 \quad (13)$$

と書ける。

7. 3 定常ロスビー波

ここで、どのような型のじょう乱が(13)をみたすか考える。(13)において、波型の解を仮定して、

$$\Psi' = \hat{\Psi} \exp[i(kx + ly - \omega t)] \quad (14)$$

とおく。 $\hat{\Psi}$ は定数であり、 ω は**角振動数**、 k は**東西波数**、 l は**南北波数**である。

次に、(14)を(13)に代入して、 ω と k 、 l との関係を求める。 $\frac{\partial}{\partial t}$ は $-i\omega$ に、 $\frac{\partial}{\partial x}$ は

ik に、 $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$ は $-k^2$ に、 $\frac{\partial^2}{\partial y^2}$ は $-l^2$ に置きかえることができるから、

$$(\omega - Uk)(k^2 + l^2) + \beta k = 0$$


つまり、

$$\omega = Uk - \frac{\beta k}{k^2 + l^2} \quad (15)$$

が得られる。このように、波動の角振動数を波数の関数として表した式を、**分散関係式**という。定常解、つまり位相速度 $\frac{\omega}{k}$ がゼロである解を考えて、 $\frac{\omega}{k} = 0$ とすると、

$$k^2 + l^2 = \frac{\beta}{U} \quad (16)$$


となる。これが**定常ロスビー波**の分散関係式である。全球規模の大気の運動を傾圧不安定波の時間スケールよりもじゅうぶんに長い時間で時間平均すると、定常ロスビー波を検出することができる。下の図の例では、偏西風が南北に蛇行しながら吹いていることがわかる。



NCEP/NCAR の客観解析データを用いて作成

定常ロスビー波の例（1月の月平均 500hPa 高度場 [m]）


問 7.1 以下のような風の場合において、渦度を計算せよ。



課題 7.1 式(12)から(13)を導出するとき、基本場の東西風を一様とは仮定しないで、南北方向の変化を考慮に入れたら、式(13)はどのように書きかえられるか。基本場の南北風はゼロとしてよい。

問 7.2 基本場の西風を 35 m/s として、北緯 45 度における定常ロスビー波の波長を求めよ。地球の自転角速度は $\Omega = 7.2 \times 10^{-5} /s$ 、地球の半径は $R_e = 6.4 \times 10^6$ m とする。式(16)を用いてよい。

問 7.3 下の図のように、夏季には定常ロスビー波の東西波数が大きく（東西波長が小さく）なっている。これはなぜか。定常ロスビー波の分散関係式を用いて、夏季においては西風が弱くなっていることと関連づけて説明せよ。



NCEP/NCAR の客観解析データを用いて作成
定常ロスビー波の例（8月の月平均 500hPa 高度場 [m]）